



**Torvik kraftverk i Førde kommune i
Sogn og Fjordane
Verknadar på biologisk mangfald**
Bioreg AS Rapport 2013 : 02

BIOREG AS

Rapport 2013:02

Utførande institusjon: Bioreg AS http://www.bioreg.as/	Kontaktpersonar: Finn Oldervik	ISBN-nr. 978-82-8215-231-0
Prosjektansvarleg: Finn Oldervik 6693 Mjosundet Tlf. 71 64 47 68 el. 414 38 852 E-post: finn@bioreg.as	Finansinert av: Sunnfjord Energi AS	Dato: 5. februar 2013
Referanse: Lien Langmo, S.H., Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2013. Torvik kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2013 : 02. ISBN 978-82-8215-231-0.		
Referat: På bakgrunn av krav frå statlege styresmakter er verknadane på det biologiske mangfaldet av ei vasskraftutbygging av den nedste delen av Ervikselva i Førde kommune, Sogn og Fjordane fylke vurdert. Arbeidet er konsentrert omkring førekomst av raudlisteartar og sjeldne og/eller verdfulle naturtypar. Trong for minstevassføring er vurdert og det er kome med framlegg til eventuelle avbøtande og kompenserande tiltak.		
4 emneord: Biologisk mangfald Raudlisteartar Vasskraftutbygging Registrering		

Figur 1. Framsida; Her ser ein dei nedste delane av strekninga av Ervikselva som er aktuell for utbygging. Biletet er teke frå motsett side av Førdefjorden. Ein ser at elva før det meste renn gjennom lauvskog, men at det også er planta ein del granskog langs elva. Nedst renn elva gjennom kulturgeite før den renn ut i fjorden. Heilt nedst renn den over ca 50 meter langt svaberg. Dette reknar ein som absolutt vandringshinder for anadrom fisk (Foto; Solfrid Helene Lien Langmo 06.10.2012 ©).

FØREORD

På oppdrag frå Sunnfjord Energi AS (Bjørn Helge Drage) har Bioreg AS gjort registreringar av naturtypar og raudlista artar i samband med ei planlagd kraftutbygging av Ervikelva i Førde kommune, Sogn og Fjordane fylke. Ei viktig problemstilling har vore vurdering av trong for minstevassføring.

For Sunnfjord Energi AS har Odd Rune Håland vore kontaktperson, og for grunneigaren, han sjølv, Bjørn Olav Torvik. For Bioreg AS har Finn Oldervik vore kontaktperson. Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo gjorde ei naturfagleg undersøking den 06.10.2012 både av elvestrekning som er planlagd utbygd, røyrgatetrasé, inntaksområde og stasjonsområde. Oldervik og Lien Langmo har i hovudsak forfatta rapporten, supplert av Grimstad og Olsen. Ei liknande kartlegging vart utført 24.10.2009 (Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010). Etter dette er planane for prosjektet endra.

Vi takkar oppdragsgjevarane for tilsendt bakgrunnsinformasjon og Fylkesmannen si miljøvernnavdeling ved Tore Larsen for opplysningar om artar skjerma for innsyn. Det same gjeld den nemnde grunneigaren,rådgjevar i avdeling for byggesak og arealforvaltning i Førde kommune Oddbjørn Sellevoll og Bjørn Helge Drage som var med som kjentmann under den naturfaglege undersøkinga 06.10.2012.

Dei tre som gjorde den naturfaglege undersøkinga for Bioreg AS, Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo er alle dyktige naturkartleggjarar med stor artskunnskap om dei viktigaste artsgruppene. Særleg førstnemnde er ein røynd naturtypekartleggjar og har delteke i hundrevis av liknande oppdrag som dette, meir eller mindre over heile landet. Ved ei evaluering av kvaliteten på slike rapportar og dei undersøkingane som låg til grunn, utført av Miljøfagleg Utredning AS for nokre år sidan, var både Grimstad og eine forfattaren av rapporten, Finn Oldervik å finna blant dei fire som fekk ros for grundige og gode undersøkingar. Oddvar Olsen er spesialist på fleire grupper, m.a. fugl som han har arbeidd med alt frå tidleg ungdom. I dei seinaste åra har han lært seg det meste av karplantar, mose og lav, inkludert naturtypar. På lav er han i dag ein av Noregs fremste kjennarar. Solfrid Helene Lien Langmo er utdanna naturforvaltar ved HINT og har slik ein svært relevant bakgrunn for kartlegging av natur. Ho hadde store artskunnskapar, særleg om karplantar då ho vart tilsett i Bioreg sommaren 2012, og har sidan arbeidd målretta for å tileigna seg meir kunnskap om bl.a. kryptogamar. Dessutan har alle dei tre nemnde vore kursa i el-fiske og akvatiske miljø generelt i løpet av sommaren 2012. El-fiskerapportane er det no Solfrid som har hovudansvaret for, saman med Oddvar Olsen. For lister over publikasjonane våre viser vi til nettsida vår.

Rissa/Aure/Hareid/Volda 5. februar 2013

Solfrid H. L. Langmo Finn Oldervik Karl J. Grimstad Oddvar Olsen

SAMANDRAG

Bakgrunn

Grunneigaren, har saman med Bjørn Helge Drage, planar om å utnytta deler av Ervikselva i Ervika, Førde kommune i Sogn og Fjordane til drift av småkraftverk.

I samband med dette stiller statlege styresmakter (Direktoratet for naturforvaltning, Olje- og energidepartementet) krav om at eventuelle førekommstar av raudlisteartar og artsmangfald elles i utbyggingsområdet skal undersøkjast. På oppdrag frå Sunnfjord Energi AS, har Bioreg AS gjennomført ei slik kartlegging i og inntil utbyggingsområdet, samt vurdert verknadane av ei eventuell utbygging på dei registrerte naturkvalitetane. Delar av influensområdet vart også kartlagt i 2009 (Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010).

Utbyggingsplanar

Inntaket i Ervikselva er planlagt plassert ca ved kote 125, ikkje langt ovanfor der elva renn ned i bekkekløfta ved Avkjelhammaren. Herfrå skal vatnet leiast via røyr i borehol på vestsida av elva ned til om lag kote 75 rett ovanfor innmarka i Ervika. Herfrå vert vatnet ført vidare gjennom nedgravne røyr ned til kraftstasjonen. Denne er planlagt plassert på vestsida av elva heilt nede ved sjøen i Ervika, noko som gjev eit brutto fall på ca 125 m. Røyret vil få ei lengd på om lag 720 m med Ø = 1400 mm. Kraftverket vil verta liggjande i dagen med ein kort avlaupskanal til sjøen, og vil få eit areal på om lag 80 m². Det vil verte oppført i tråd med lokale byggetradisjonar. Det er planlagt ein kombinert parkerings- og snuplass i samband med kraftstasjonen.

Tilkomstvegen til inntaket vert berre nokre få meter lang, då elva her renn tett inntil vegen ved sjøen. Tilkomstvegen til stasjonen vil i all hovudsak fylge eksisterande veg ned til Ervika.

Nedbørsområdet for dette prosjektet er på om lag 21,6 km² og årleg middelavrenning 1860 l/s. Alminneleg lågvassføring er rekna til ca 100 l/s. 5-persentil sommar vert på 108 l/s medan 5-persentil vinter vil verta 80 l/s. Omsøkt minstevassføring for dette prosjektet er 100 l/s i sommarsesongen og 90 l/s i vintersesongen.

For nettilknyting vil ein leggja ein ca 300 meter lang nedgraven jordkabel i samband med røygatetraseen sørover frå kraftstasjonen, og knyte denne inn på eksisterande 22 kv-line som kjem ned i Ervika og held fram vidare utover langs Førdefjorden.

Utbyggingsplanane er motteke frå Sunnfjord Energi AS ved Odd Rune Håland. Uklare punkt har vore drøfta over telefonen mellom underteikna og Håland.

Metode

NVE har utarbeidd ein vegleiari (Veileder nr. 3/2009), "Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1 -- 10 MW)." Metoden skildra i vegleiaren er lagt til grunn i denne rapporten. Informasjon om området er samla inn gjennom litteratur- og databasegjennomgang,

kontakt m.a. med oppdragsgjevar og lokalkjende. Elles er datagrunnlaget stort sett basert på eige feltarbeid den 24.10.2009 og 06.10.2012.

Naturgrunnlaget

I følgje berggrunnskartet skal det være diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, som dominerer berggrunnen innan utbyggingsområdet. Desse bergartane gjev ofta ikkje grunnlag for anna enn ein triviell flora og den naturfaglege undersøkinga viste at dette samsvarar godt med det som vart observert. Innanfor nedbørssfeltet er det også ein del amfibolitt og glimmerskifer samt amfibolitt og grønstein (Kjelde: ngu.no). I følgje Moen (1998) så ligg utbyggingsområdet hovudsakleg i sørboreal vegetasjonszone, medan nedbørssfeltet ligg i mellomboreale og alpine soner.



Figur 2. Den rauda firkanten om lag midt på biletet markerer utbyggingsområdet, og som ein ser så ligg området på sørsida av Førdefjorden i Sunnfjord. Utbyggingsområdet ligg noko vest for tettstaden Førde, og i Førde kommune. Kartet er henta fra GisLink.

Vurdering av verknadar på naturmiljøet

Terrestriske verdiar og verknader

Floraen i området er jamt over fattig, og i mesteparten av utbyggingsområdet og områda rundt er det triviell blåbærskog og/eller røsslyng-blokkbær-furuskog. Langs elva er det område med gråor-heggeskog, sølvbunkeutforming og storbregneskog, storbregne-bjørk-utforming. Oppe i bekkeklofta er også ein del høgstaudeskog med artar som; mjødurt, bringebær, markjordbær, skogstjerneblom, vendelrot, revebjølle, trollurt, sauetelg, skogburkne, junkerbregne og storfrytle. Elles er det ein del område med blokkmark langs elva. Også her dominerer vegetasjonstypene som nemnd ovanfor. Kryptogamfloraen er middels artsrik og ber preg av stabile fukttilhøve nær elva innan det meste av influensområdet, men utan registreringar av dei mest kravfulle artane.

Dei nedste delane av influensområdet er no (2013) nytta for slått og sauebeite. Aust for elva er areala også brukt til slått ved hesjing. Her er det avgrensa ein B-lokalitet med den prioriterte naturtypen, slåttemark. Langs elva frå sjøen og heilt oppom fossen ved Avkjel-hammaren er det

planta ein del gran langs elvestrengen. Denne frørar seg, og ein registrerte ein del yngre gran ved dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012.

Akvatiske verdiar og verknadar

I følgje grunneigar, Bjørn Torvik som bur i Ervika finst det ein bestand av bekkeaur i Ervikselva. Same kjelde kjenner ikkje til at det nokon gong er registrert ål eller elvemusling i elva. Då det var svært høg vassføring under dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012, ga dei ingen svar på om desse artane finst i elva eller ikkje. På strekninga som vert fråført vatn, vil det verte sterkt nedsett produksjon av invertebratar i høve til før utbygginga. Dette vil i sin tur medføra forringa livsvilkår for vasstilknytt fugl, og for fisk om det finst i elva. I desse delane av landet er det helst fossekall og strandsnipe (**NT**) som vil merke dette, men også vintererle vil utan tvil kunne førekoma i denne elva.

Samtidig som ein utførte den terrestriske kartlegginga, vart også botnsubstratet i elva visuelt undersøkt innanfor influensområdet i den grad dette var mogleg på grunn av høg vassstand i elva. I all hovudsak bestod botnsubstratet av stor stein og blokk. Gytegrus for bekkeauren fanst det helst i hølar og bak større steinar.

Absolutt vandringshinder i Ervikselva er eit om lag 50 meter langt svaberg heilt nede ved sjøen. I tillegg finst det fleire større og mindre fossar lenger oppover i vassdraget, så ein reknar det som sikkert at det ikkje gyt anadrom fisk innanfor influensområdet for dette kraftverket.

I følgje Artsdatabanken sitt Artskart er det ikkje registrert ål i dette vassdraget, men i fleire vassdrag noko lenger ut i Førdefjorden.

Ved gjennomgang av databasen som Fylkesmannen i Nord-Trønderlag har oppretta i samband med handlingsplan for elvemusling, fann ein at det i Førde kommune ikkje er registrert nokre vassdrag med kjend førekomst av elvemusling. I følgje Kålås m. fl. 2010, er det berre påvist elvemusling i fire vassdrag i Sogn og Fjordane (Kålås m. fl. 2010).

Verdi, omfang og verknad/konsekvens.

Naturbase viser at det ikkje er avgrensa prioriterte naturtypar innan influensområdet til prosjektet tidlegare. Ved dei naturfaglege undersøkingane den 24.10.2009, vart det avgrensa ein prioritert naturtype, men sidan planane stogga opp den gongen, så er ikkje denne lokaliteten kome inn i Naturbase. Områda frå fossen ved Avkjelhammaren ned til om lag kote 55 vart då avgrensa som bekkekloft og bergvegg. Som nemnd tidlegare, så vart det ved dei naturfaglege undersøkingane den 06.10.2012 avgrensa ei slåttemark på austsida av elva. Ein ventar ikkje at tiltaket vil gje noko negativt omfang for den siste lokaliteten. Det vart ikkje registrert raudlisteartar ved nokon av kartleggingane. Samla er influensområdet inkludert utbyggingsområdet vurdert å vera av **middels verdi** for biologisk mangfald. Omfanget av ei eventuell utbygging er rekna som **middels/lite negativt**. Konsekvensen/verknaden av ei eventuell utbygging vert difor **middels negativ** i følgje konsekvensvifta.

Avbøtande tiltak

Kva gjeld vasstilknytt fugl, er det registrert både fossekall og strandsnipe (NT) i vassdraget. Ein observerte også fossekall under dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012. Det vart registrert kryptogamar i ei bekkekløft som tilseier at det er viktig med eit stabilt fuktig miljø, sjølv om ingen av dei registrerte artane er raudlista. Ein ser likevel ikkje bort frå at slike artar finst i bekkekløfta og vi vil difor koma med framlegg om at 10-persentilen vert lagt til grunn for den pålagde minstevassføringa om sommaren, medan 5-persentil vinter vil vera tilstrekkeleg i vinterhalvåret. For kryptogamane er det i første rekke i vekstsesongen det er viktig med minstevassføring, men om ein skal ta omsyn til botnfaunaen, så er det også viktig at elva ikkje går tørr om vinteren. Eit slik tiltak vil i nokon grad redusera dei eventuelle negative verknadane av ei utbygging.

For å betra hekkevilkåra for fossekall etter ei eventuell utbygging bør predatorsikre hekkekassar for fuglen monterast på minst ein stad ved elva. I dette tilfellet vil den beste staden truleg vera ved fossen ved Avkjel-hammaren. Også under bruver kan vera gode stadar for slike kassar. Viktigast er det likevel å montera kassar der det eventuelt er påvist reir. Ein bør montera to kassar på kvar stad.

Forstyrra miljø (vegar, grøfter og liknande) bør ikkje såast til med framandt plantemateriale.



Figur 3. Kartutsnittet viser i grove trekk dei viktigaste naturinngrepa i form av inntak, tunell, røyrgate, tilkomstveg og kraftstasjon. Kartet er henta frå konsesjonssøknaden.

Vurdering av usikkerheit

Registrerings- og verdiusikkerheit. Det meste av influensområdet er oppsøkt og vurdert, særleg med tanke på karplantar, mose og lav. Det er likevel eit område ved Avkjel-hammaren som ikkje var muleg å koma til, utan å utsetja seg for ein vesentleg risiko. Det er difor knytt noko usikkerheit til om kor vidt det kan finnast sjeldne og/eller spesielt fuktkrevjande mosar her. Ein kan heller ikkje sikkert konstatere kor vidt ål finst innanfor influensområdet til dette prosjektet. Vi vurderer difor registrerings- og verdisikkerheita som middels. Utanom desse to punkta,

så vurderer vi både geografisk og artsmessig dekningsgrad som god innan influensområdet til prosjektet.

Usikkerheit i omfang. Ut i frå dei registreringane og verdivurderingane som er gjort, og slik planane er skissert, så meiner vi at usikkerheita på dei fleste punkta er lita. Unntaket er omfanget for dei delane av bekkekløfta ein ikkje fekk undersøkt, samt for å om arten likevel skulle finnast her.

Usikkerheit i vurdering av konsekvens. Sidan vi ser på usikkerheita i registrering og verdivurdering som middels, og uvissa i omfangsvurderingane som relativt lita, så vil usikkerheita i konsekvensvurderinga verta middels/lita for heile dette prosjektet.



Figur 4. Dette biletet er teke ved utløpet til sjøen. Dette svaberget hindrar anadrom fisk i å gå opp i elva (Foto; Oddvar Olsen 06.10.2012. ©).

INNHALDSLISTERE

1	INNLEIING	10
2	UTBYGGINGSPLANANE	10
3	METODE	12
3.1	Datagrunnlag	12
3.2	Vurdering av verdiar og konsekvensar.....	13
4	AVGRENSING AV INFLUENSOMRÅDET	16
5	STATUS - VERDI.....	17
5.1	Kunnskapsstatus	17
5.2	Naturgrunnlaget.....	18
5.3	Artsmangfold og vegetasjonstypar	21
5.4	Raudlisteartar	26
5.5	Naturtypar.....	26
6	VERDI, OMFANG OG VERKNAD AV TILTAKET	30
6.1	Verdien av utbyggingsområdet.....	30
6.2	Omfang og verknad.....	31
6.3	Samanlikning med andre nedbørsfelt/vassdrag.....	32
7	SAMANSTILLING	34
8	MULEGE AVBØTANDE TILTAK OG DEIRA EFFEKT	34
9	VURDERING AV USIKKERHEIT	35
10	PROGRAM FOR VIDARE UNDERSØKINGAR OG OVERVAKING	35
	REFERANSAR	37
10.1	Litteratur	37
10.2	Munnlege kjelder	38
10.3	Kilder fra internett	38

1

INNLEIING

Dei nasjonale strategiske måla for naturens mangfald er formulert slik i St. meld. nr. 26 (2006-2007):

- Naturen skal forvaltast slik at artar som finst naturleg vert sikra i levedyktige bestandar, og slik at variasjonen av naturtypar og landskap vert oppretthalde og gjer det muleg å sikra at det biologiske mangfaldet framleis kan utviklast.
- Noreg har hatt som mål å stoppa tapet av biologisk mangfald innan 2010, men denne målsettinga vart dverre langt frå nådd.

Målformuleringane omfattar artar, og variasjonen innan artene, og naturtypar. Naturen er dynamisk og eit visst tap av biologisk mangfald er naturleg. Målsettinga må tolkast slik at det er tapet av biologisk mangfald som skuldast menneskeleg aktivitet som skal opphøyre. Utbygging av små kraftverk kan påverka det biologiske mangfaldet på ulikt vis avhengig av lokale tilhøve. Sams for alle prosjekta er likevel verknadane av at vassdraget vert fråført vatn.

I juni 2007 kom det eit omfattande skriv frå OED, "Retningslinjer for små vasskraftverk". Retningslinene bygger i hovudsak på eit utkast til retningsliner utarbeidd av NVE i samråd med Direktoratet for naturforvaltning og med faglege innspel frå ymse andre. Biologisk mangfald er omtala i kapittel 5.2. I eit tidlegare brev om obligatorisk utsjekking av biologisk mangfald frå OED heiter det mellom anna:

"Undersøkelsen forutsettes å omfatte en utsjekking av eventuelle forekomster av arter på den norske rødlista og en vurdering av artssammensetningen i utbyggingsområdet i forhold til uregulerte deler av vassdraget og/eller tilsvarende nærliggende vassdrag. Det kan fastsettes en minstevannføring i hele eller deler av året dersom den faglige undersøkelsen viser at dette kan gi en vesentlig miljøgevinst."

Som ein konsekvens av dette vart det av NVE utarbeidd ein vegleiari til bruk i slike saker, no oppdatert til Vegleiari nr. 3/2009, "Dokumentasjon av biologisk mangfald ved bygging av småkraftverk (1 -- 10 MW). Revidert utgåve" Denne vegleiaren er brukt som rettesnor for denne rapporten.

Hovudføremålet ved rapporten vil være å;

- Skildre naturtilhøve og verdiar i området.
- Vurdere konsekvensar av tiltaket for biologisk mangfald.
- Vurdere trøng for og verknad av avbøtande tiltak.

Ei viktig problemstilling er å vurdera behovet for minstevassføring. I samband med dette har vassressurslova i paragraf 10 følgjande hovudregel; *"Ved uttak og bortleidning av vatn som endrar vassføringa i elvar og bekkar med årsikker vassføring, skal minst den alminnelege lågvassføringa være tilbake, om ikkje anna følgjer av denne paragrafen."¹*

2

UTBYGGINGSPLANANE

Inntaket i Ervikselva er planlagt plassert ca ved kote 125, ikkje langt ovanfor der elva renn ned i bekkekløfta i Ervika. Herifra skal vatnet leiast

¹ Lovteksta er omsett til nynorsk av FGO.


via røyr i tunell på vestsida av elva ned til om lag kote 75 rett ovanfor innmarka i Ervika. Vidare vert vatnet ført gjennom nedgravne røyr ned til kraftstasjonen. Denne er planlagt plassert på vestsida av elva heilt nede ved sjøen i Ervika, noko som gjev eit brutto fall på ca 125 m. Røyret vil få ei lengd på om lag 720 m med $\varnothing = 1400$ mm. Kraftverket vil verta liggjande i dagen med ein kort avlaupskanal til sjøen, og vil få eit areal på om lag 80 m². Det vil verte oppført i tråd med lokale byggetradisjonar. Det er planlagt ein kombinert parkerings- og snuplass i samband med kraftstasjonen.

Tilkomstvegen til inntaket vert berre nokre få meter lang, då elva her renn tett inntil vegen nede ved sjøen. Tilkomstvegen til stasjonen vil i all hovudsak fylge eksisterande veg ned til Ervika.

Nedbørsområdet for dette prosjektet er om lag 21,6 km² og årleg middelavrenning 1860 l/s. Alminneleg lågvassføring er rekna til ca 100 l/s. 5-persentil sommar vert på 108 l/s medan 5-persentil vinter vil verta 80 l/s. Omsøkt minstevassføring for prosjektet er 100 l/s i sommarsesesongen og 90 l/s i vintersesongen.

For nettilknyting vil ein leggja ein ca 300 meter lang nedgraven jordkabel i samband med røyrgatetraseen austover frå kraftstasjonen, og knyte denne inn på eksisterande 22 kv-line som kjem ned i Ervika og held fram utover langs Førdefjorden.

Utbyggingsplanane er motteke frå Sunnfjord Energi AS ved Odd Rune Håland som skriv konsesjonssøknaden. Uklare punkt har vore drøfta over telefonen mellom underteikna og Håland.



Figur 5 Kartet viser kor ein var innan utbyggingsområdet ved den siste undersøkinga 06.10.2012. Dei områda som ein vurderte hadde potensiale for interessante artar og miljø vart grundigast undersøkt. Vi har ikkje bevart sporingsruter frå undersøkinga som vart gjort i 2009.



Figur 6. Det er her ein stad at inntaket er tenkt etablert. Fram hit renn Ervikelva relativt flatt, før ho byrjar å gå brattare nedover dalen. Botnsubstratet i elva består i hovudsak av større og mindre blokk og rullestein. Trevegetasjonen er i hovudsak planta gran. I feltsjiktet dominerer mellom anna blåbær, blokkebær, sølvbunke og ulike bregnar. Mange stader er granskogen så tett at det berre er mose som veks på bakken (Foto; Solfrid Helene Lien Langmo 06.10.2012 ©).

3

METODE

NVE har utarbeidd ein vegleiari (Vegleiari nr. 3/2009), "Dokumentasjon av biologisk mangfald ved bygging av småkraftverk (1 -- 10 MW) Rev. utgåve." Metoden skildra i vegleiaren er lagt til grunn i denne rapporten. Mal for konsekvensutgreiingar er følgd, og sentrale delar av metodekapitlet er henta frå Handbok 140 (Statens vegvesen 2006).

3.1

Datagrunnlag

Datagrunnlag er eit uttrykk for kor grundig utgreiinga er, men også for kor lett tilgjengeleg opplysningane som er naudsynte for å trekka konklusjonar på status/verdi og konsekvensgradar er.

Generelt. Så langt finst det ikkje nokon samla kunnskapsoversikt over biologisk mangfald knytt til slike små vassdrag i Noreg, og m.a. difor er eiga erfaring og kompetanse svært viktig. I tillegg til dette, så er vurderinga av noverande status for det biologiske mangfaldet gjort m.a. med støtte i ymse litteratur som; Raddum et al (2006) (botnfauna m.m.), kurs ved Hans Blom sommaren 2006 (fuktkrevjande mosar, særskild Vestlandet) samtalar med Oddvar Hanssen, NINA (biller og andre insektgrupper), den nye raudlista (Kålås et al (red) (2010)), den nye raudlista for naturtypar Lindgård & Henriksen (2011)) og elles relevant namnsetjingslitteratur som Lid & Lid (2005) (karplanter), Krog et al (1994)

(Norske busk og bladlav), Holien & Tønsberg (2006) (Norsk lavflora), Smith (2004) (bladmosar), Damsholt (2002) (levermosar) med mykje meir.

Konkret. Utbyggingsplanane og dokument i samband med desse er motteke fra Odd Rune Håland, Sunnfjord Energi AS. Opplysninga om vilt har ein m.a. fått frå grunneigar, Bjørn Olav Torvik. Også rådgjevar i avdeling for byggesak og arealforvaltning i Førde kommune Oddbjørn Sellevoll har kome med opplysningar om ymse lokale tilhøve. Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase samt andre relevante databasar er sjekka for tidlegare registreringar, samt at ein har fått opplysningar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved Tore Larsen.

Ein har også gjennomgått anna relevant litteratur. Også Artsdatabanken sitt artskart (<http://artsdatabanken.no>) er gjennomgått, samt at det er gjort ei naturfagleg undersøking av Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo den 06.10.2012. Ei liknande kartlegging vart utført den 24.10.2009 (Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010). Etter dette er planane endra, og ei ny undersøking vart difor utført i 2012.

Dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012 vart gjort i overskya ver med lette regnbyer, men med god sikt. Det hadde regna kraftig på førehand, så vasstanden i elva var høg under undersøkingane. Både områda langs elvestrenget, røygata, inntaket og kraftstasjonen vart undersøkt. Også område for eventuell tilkomstveg og for utslepp av driftsvatnet vart undersøkt og vurdert med tanke på naturverdiar og biologisk mangfald. Heile influensområdet vart undersøkt, både med tanke på karplantar, mose og lav. Også andre organismegrupper, slik som sopp og fugl m.m. vart registrert i den grad ein observerte noko av interesse. GPS vart nytta for nøyaktig stadfesting av interessante funn.

Tilgjengelegheit. Heile influensområdet med unntak av bergveggane ved fossen ved Avkjel-hammaren var relativt greitt tilgjengeleg for undersøkingar, og ein fekk difor undersøkt det meste av området.

3.2

Vurdering av verdiar og konsekvensar

Desse vurderingane er grunna på ein "standardisert" og systematisk tre-trinns prosedyre for å gjera analysar, konklusjonar og tilrådingar meir objektive, lettare å forstå og lettare å etterprøva.

Steg 1	Verdsetting for tema biologisk mangfald er gjort ut frå ulike kjelder og basert på metode utarbeidd av Statens vegvesen.
Status/Verdi	Verdien vert fastsett langs ein skala som spenner frå <i>liten verdi</i> til <i>stor verdi</i> (sjå døme).

Tabell 1. Kriterium for verdisetting av naturområde

Kjelde	Stor verdi	Middels verdi	Liten verdi
Naturtypar www.naturbasen.no DN-handbok 13; Kartlegging av naturtypar DN-handbok 11; Vilkartlegging DN-handbok 15; Kartlegging av ferskvasslokalitetar.	<ul style="list-style-type: none"> Naturtypar som er vurdert som svært viktige (verdi A) Svært viktige viltområde (vekttal 4-5) Ferskvasslokalitetar som er vurdert som viktige (verdi A). 	<ul style="list-style-type: none"> Naturtypar som er vurdert som viktige (verdi B og C) Viktige viltområde (vekttal 2-3) Ferskvasslokalitetar som er vurdert som viktige (verdi B og C). 	<ul style="list-style-type: none"> Andre område
Raudlisteartar Norsk raudliste 2006 (www.artsdatabanken.no) www.naturbasen.no	Viktige område for : <ul style="list-style-type: none"> Artar i kategoriene ”kritisk truga” og ”sterkt truga” Artar på Bernliste II Artar på Bonnliste I 	Viktige område for: <ul style="list-style-type: none"> Artar i kategoriene ”sårbar”, ”nær truga” eller ”datamangel”. Artar som står på den regionale raudlista. 	<ul style="list-style-type: none"> Andre område.
Truga vegetasjonstypar Frøystad og Moen 2001	<ul style="list-style-type: none"> Område med vegetasjonstypar i kategoriene ”akutt truga” og ”sterkt truga”. 	<ul style="list-style-type: none"> Område med vegetasjonstypar i kategoriene ”noko truga” og ”omsynskrevjande” 	<ul style="list-style-type: none"> Andre område.
Lovstatus Ulike verneplanarbeid, spesielt vassdragsvern.	<ul style="list-style-type: none"> Område verna eller foreslått verna 	<ul style="list-style-type: none"> Område som er vurdert, men ikke verna etter naturvernloven, og som kan ha regionalverdi Lokale verneområde (pbl.) 	<ul style="list-style-type: none"> Område som er vurdert, men ikke verna etter naturvernloven, og som er funne å ha berre lokal naturverdi

Raudlisteartar er eit vesentleg kriterium for å verdisetja ein lokalitet. Ny norsk raudliste ble presentert 6. desember 2006 (Kålås m.fl. 2006), og denne medfører ein del viktige endringar i høve tidlegare raudlister. Denne raudlista vart revidert på nytt i 2010 (Kålås m.fl., 2010). IUCNs kriteriar for raudlisting av arter (IUCN 2001) er for første gong nytta i raudlistearbeidet i Noreg. Dei nye raudlistekategoriene si rangering og avstuttingar er (med engelsk namn i parentes) :

RE – Regionaltutrydda (Regionally Extinct)

CR – Kritisktruga (Critically Endangered)

EN – Sterkt truga (Endangered)

VU – Sårbar (Vulnerable)

NT – Nær truga (Near Threatened)

DD – Datamangel (Data Deficient)

A - Norsk ansvarsart

Elles viser vi til Kålås m.fl. (2010) for nærmere utgreiing om inndeling, metodar og artsutval for den norske raudlista. Der er det også kort gjort greie for kva for miljø artane lever i og viktige trugsmålsfaktorar.

Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor
----- -----		

Steg 2 Omfang	I steg 2 skal ein skildra og vurdera type og omfang av moglege verknader om tiltaket vert gjennomført. Verknadane vert m.a. vurdert ut frå omfang i tid og rom, og kor truleg det er at dei skal oppstå. Omfanget vert vurdert langs ein skala frå <i>stort negativt omfang</i> til <i>stort positivt omfang</i> (sjå døme).
--------------------------------	--

Omfang				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / ikkje noko	Middels pos.	Stort pos.
----- ----- ----- -----				

Steg 3 Verknad	I det tredje og siste steget i vurderingane skal ein kombinera verdien (temaet) og omfanget av tiltaket for å få den samla vurderinga. Denne samanstillinga gjev eit resultat langs ein skala frå <i>svært stor positiv verknad</i> til <i>svært stor negativ verknad</i> (sjå under). Dei ulike kategoriane er illustrert ved å nytta symbola "-" og "+".
---------------------------------	---

Symbol	Skildring
++++	Svært stor positiv verknad
+++	Stor positiv verknad
++	Middels positiv verknad
+	Liten positiv verknad
0	liten/ingen verknad
-	Liten negativ verknad
--	Middels negativ verknad
---	Stor negativ verknad
----	Svært stor negativ verknad

Oppsummering	Vurderinga vert avslutta med eit oppsummeringsskjema for temaet (Kap. 7). Dette skjemaet oppsummerar verdivurderingane, vurderingane av omfang og verknadar og ein kort vurdering av kor gode grunnlagsdata ein har (kvalitet og kantitet), som ein indikasjon på kor sikre vurderingane er. Datagrunnlaget blir klassifisert i fire grupper som følgjer:
---------------------	---


Klasse	Skildring
1	Svært godt datagrunnlag
2	Godt datagrunnlag
3	Middels godt datagrunnlag
4	Mindre godt datagrunnlag

4

AVGRENSING AV INFLUENSOMRÅDET

- Strekningar som vert fråført vatn.
 - Ervikelva, omlag frå kote 125 og ned til kote 0 moh.
- Inntaksområde.
 - Inntak i Ervikelva ved kote 125 moh.
- Stasjonsområde.
 - Kraftstasjon ved sjøen vest for Ervikelva om lag ved kote 0.
- Andre område med terrenginngrep.
 - Nedgravne røyr frå utløpet av tunellen og ned til kraftverket.
 - Veg til inntaket.
 - Nettilknyting langs røyrgata og vidare opp til 22 kv-line.
 - Depot-området tett ved Avkjelhammaren som arronderingsmasse².

Som influensområde er rekna ei om lag 100 m brei sone rundt inngrepa som er nemnd ovafor. Dette er ei relativt grov og skjønnsmessig vurdering grunna ut frå kva for naturmiljø og artar i området som direkte eller indirekte kan verta påverka av tiltaket. Influensområdet saman med dei planlagde tiltaka (utbyggingsområdet) utgjer undersøkingsområdet.



Figur 7. Kartutsnittet viser ei tenkt avgrensing av influensområdet i samband med dei planlagde inngrepa. Også avgrensinga av dei to prioriterte naturtypelokalitetane er med. Vi ser at begge lokalitetane ligg innanfor influensområdet. Heile lokalitet 1 vert direkte påverka i og med at elva vert fråført vatn. Kartet er henta frå GisLink.

² Mykje av tunnelmassane vil verta nytta som fyllmasse kring røyret

5

STATUS - VERDI

5.1

Kunnskapsstatus

På førehand hadde ein lite kunnskap omkring det biologiske mangfaldet i undersøkingsområdet. Eit søk på DN's Naturbase viser ingen avgrensingar av naturtypelokalitetar.

Utanom strandsnipe (NT), så viser Artsdatabanken sitt artskart ingen registreringar av raudlista dyr, planter, kryptogamar eller sopp innan utbyggingsområdet. Utanom desse og eigne registreringar, er det grunneigar Bjørn Olav Torvik som har gjeve opplysningar om dyrelivet i og omkring utbyggingsområdet. Dessutan har fylkesmannen si miljøvernnavdeling ved Tore Larsen vore kontakta vedrørande artar som er skjerma for offentleg innsyn, men han hadde ingenting å melde. Også rådgjevar i avdeling for byggesak og arealforvaltning i Førde kommune Oddbjørn Sellevoll har kome med opplysningar om ymse lokale tilhøve.

I følgje grunneigar, Bjørn Torvik som bur i Ervika, finst det ein bestand av bekkeaur i Ervikselva. Same kjelde kjende ikkje til at det nokon gong hadde vore observert anadrom fisk, ål eller elvemusling i elva. Ved dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012 såg ein at absolutt vandringshinder i Ervikselva, var eit om lag 50 meter langt svaberg heilt nede ved sjøen. I følgje artsdatabankens Artskart er det ikkje registrert ål i dette vassdraget, men arten er registrert i fleire vassdrag noko lenger ut i Førdefjorden.

Ved gjennomgang av databasen som Fylkesmannen i Nord-Trønderlag har oppretta i samband med handlingsplan for elvemusling, fann ein at det i Førde kommune ikkje er registrert noko vassdrag med kjend førekomst av elvemusling. I følgje Kålås m. fl. (2010), er det berre påvist elvemusling i fire vassdrag i Sogn og Fjordane. Då det var heller høg vassføring under dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012, var det ikkje muleg å sikkert kunne konstatera om ål eller elvemusling finst i elva eller ikkje.

I Rovbase er det registrert to sauekadaver der dyra er drepne av kongeørn ca 2 km frå influensområdet, og fleire andre elles innanfor Førde kommune. Kongeørna var raudlista fram til nov. 2010, men er no vurdert som livskraftig. Det er også registrert sau drepne av gaupe (**VU**) i fleire av kommunane rundt.


Ved eigne undersøkingar 24.10.2009 og 06.10.2012 vart dei terrestriske miljøa innanfor influensområdet undersøkt med tanke på karplanteflora, vegetasjonstypar, fugleliv, lav- og moseflora og naturtypar. Områda nedstraums inntaksstadane vart undersøkt, og då særleg med tanke på krevjande artar av mose og lav. I tillegg vart karplantefloraen grundig undersøkt. Influensområdet vart elles undersøkt med omsyn til vegetasjon generelt og kravfulle artar spesielt. Under dei same undersøkingane vart dei akvatiske miljøa visuelt undersøkt innanfor influensområdet med tanke på botnsubstrat og vegetasjon i elva så langt det let seg gjera.

5.2


Naturgrunnlaget

Geologi og landskap

I følgje berggrunnskartet skal det være diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, som dominerer berggrunnen her. Dette er bergartar frå proterozoisk tid, deformert og omdanna under den kaledonske fjellkjededanninga. Innanfor nedbørssfeltet er det også ein del amfibolitt og glimmerskifer samt amfibolitt og grønstein (www.ngu.no.). Gneis og granitt gjev i regelen berre grunnlag for ein fattig og nøyssam flora. Floraen som vart observert under den naturfaglege undersøkinga viste seg å stemma bra med det ein kunne vente å finna ut frå ein fattig berggrunn, men med enkelte innslag av meir krevjande artar.



Figur 8. I følgje berggrunnskartet, så er det diorittisk til granittisk gneis og migmatitt som dominerer i heile utbyggingsområdet. Desse bergartane gjev normalt berre grunnlag for ein fattig flora. (Kjelde NGU).



Figur 9. Utanom heilt nedst er det lite lausmassar innan utbyggingsområdet. For det meste er det forvitningsmateriale. Nedst i området er det noko breelvavsetning (Kjelde: NGU).

Lausmassar er det relativt lite av i mykje av tiltaksområde. Heilt nedst innan utbyggingsområdet er det likevel eit område med breelvavsetning. Elles er det stort sett forvitningsmateriale innan resten av tiltaksområdet.

Landformer. Nedbørsområdet utgjer ein vid dal med slake lisider der elva renn roleg nedover. Heilt øvst i utbyggingsområdet renn elva flatt, før den renn bratt nedover dalen som utgjer ei markert kløft, og i all hovudsak er eksponert mot nordvest.

Topografi

Nedbørsfeltet til Ervikelva (Vassdragsnummer 084.61Z) er avgrensa mellom fjell og åsar. I nord ligg mellom anna Nobbane (562 moh) og Fauskevarden (853 moh). I aust ligg Hallbrendsnipa (801 moh) og i sør ligg mellom anna Rimmane.

Ervikelva har si byrjing i fjellsidene rundt Flotevatna, Liastølvatnet og Solheimsstølvatnet. Nedanfor dette vatnet heiter elva Ervikelva. Her renn elva i sørleg retning. På veg nedover dalen svingar elva i vestleg retning. Det kjem stadig til nye bekkar og små elvar, til elva renn ut i Karstadvatnet. Nedanfor Karstadvatnet renn elva i nordvestleg retning slakt framover Solheimsdalen og renn sammen med Stølselva og fleire småbekkar. Rett nedanfor inntaket og om lag ved kote 115 renn elva bratt utfor fossen ved Avkjel-hammaren, og renn ut i Førdefjorden ved Ervika. Både Karstadvatnet og myrområda innanfor nedbørsfeltet gjev ein viss magasineffekt og er med å dempe flaum i noko grad. Også høgda på nokre av fjella kring utbyggingsområdet gjer at snøen vil magasinera noko vatn til ut på sommaren. Mesteparten av nedbørsfeltet ligg i fjell- og skogsområde.

Klima

Utbyggingsområdet er plassert i landskapsregion 22, Midtre bygder på Vestlandet, underregion 22.14, Jordbruksbygdene i Sunnfjord. (Pushman 2005). Når det gjeld vegetasjonsseksjon, så plasserer Moen (1998) utbyggingsområdet og nedbørsområdet på grensa mellom klart oseanisk (O2) seksjon og sterkt oseanisk seksjon – humid underseksjon (O3h). Også nedbørsområdet ligg i desse seksjonane. Plantelivet i klart oseanisk seksjon er prega av vestlege og fuktkrevjande vegetasjonstypar og artar, men også artar med svake austlege trekk inngår, medan humid underseksjon er prega av vegetasjonstypar og artar som er avhengig av høg luftfukt. Nordboreal sone manglar i desse områda. Dei alpine sonene er artsfattige då dei manglar ei rekke artar som er avhengige av stabile vintertilhøve. Same kjelde plasserer utbyggingsområdet og nedbørsfeltet i fleire vegetasjonssoner, der utbyggingsområdet ligg i sørboreal sone, med overgang til mellomboreal og alpine soner i nedbørsfeltet.

Den nærmeste målestasjonen for nedbør ligg i Naustdal i Naustdal kommune, ca 10 km nordaust for utbyggingsområdet. Målestasjonen viser ein gjennomsnittleg årleg nedbør på 2335 mm i perioden 1961 - 1990. Stasjonen viser vidare at september er den mest nedbørsrike månaden med 299 mm, medan mai er turrast med 96 mm. Temperaturstatistikken for denne målestasjonen viser ein snittemperatur på 6,2°C. Den kaldaste månaden er januar med -1,2°C og den varmaste er juli med 14,2°C.

Menneskeleg påverknad

Eigedomstilhøva. Kartet viser at det er to matrikkelgardar som har eigendomsrettar i Ervikelva innan utbyggingsområdet. Dette er gnr 72 Fengestad, og gnr 81 Ervika. Det er berre eit bruksnummer frå kvar av desse gardane som har rettar innan utbyggingsområdet. Fengestad eig nokre få fallmeter ved inntaket.



Figur 10 Kartet viser dei ulike teigane innanfor utbyggingsområdet i Ervikelva. Kartet er henta fra GisLink.

Historisk tilbakeblikk. Utbyggingsområdet ligg som nemnd under to gardar. Gnr 72 Fengestad er nemnd i kjeldene som Fiengestadt i 1563. Kva namnet tyder er ikkje sikkert, og Rygh (1913) kjem med ulike teoriar. Mellom anna kan namnet kome av det vesle vatnet som ligg ved garden, eller eit tidlegare mannsnamn; Fengi. Ei anna mogleg tyding er den staden ved vatnet der det var best moglegheit for å få fisk, eller ein stad der det var stor avkastning, enten frå marka eller vatnet.

G.nr 81 Ervika er fyrste gong nemnd i kjeldene som Eruig i 1603. Dette namnet kan i følgje Rygh (1913) ha to ulike opphav. Det eine er at det har opphav i elvenavnet Æra sams med Æruvík, eit tidlegare namn på Ervikelva. Det andre opphavet til namnet kan vere Elrivík, som tyder ein stad der det veks gråor.

Menneskeleg påverknad på naturen. Ovanfor fossen ved Avkjel-hammaren er mykje av den opphavlege skogen hogd og iplanta med gran. Stadvis er det same gjort lenger nede langs elva. Rett nedanfor fossen er skogen mykje meir urørt, og her verkar lauvskogen å ha eit visst kontinuitetspreg. Her er også areala framleis beita av sau. Tidlegare har dei også vore beita av storfe og geit (Førsund, 1992). Nedst i utbyggingsområdet kjem ein inn på kulturmarka. Denne er i stor grad beita av sau, og noko er også brukt til slått. Vegen ned til Ervika går oppe i lia vest for elva. Ei kraftline kryssar elva om lag ved inntaket. Ei bru kryssar elva i øvre del av innmarka. I sum er influensområdet til dette prosjektet ganske sterkt påverka av ymse menneskelege aktivitetar.

Ein kjenner ikkje til at det har vore kvern innanfor utbyggingsområdet til dette prosjektet tidlegare, men det har vore sag her. Denne dukkar første gong opp i kjeldene så tidleg som i 1626, og er etter det nemnt ved fleire høve. Saga låg nede ved sjøen i Ervika og var sag både for Ervika og mange av gardane i distriktet rundt. Saga vart driven ved at vatn vart leia gjennom eit 57 meter langt støypejarnsrør inn til sagbruket, som også husa høvlerimaskin og sirkelsag. Om lag midt på 1800-talet var dette den største næringsverksemda registrert i Førde. Tidlegare høyde Ervika til Naustdal kommune og ei tid var det damskipstoggestad her med tilhøyrande handel. Dei fleste brukta på Fengestad og i Heilevangdalen hadde også naust her (Førsund, 1992). Den nemnde bygningen som husa saga brann opp kring 1950 og ei ny noko mindre vart reist. Den

siste står der framleis. Vatnet i Ervikelva har også vore brukt til drift av kraftverk. Vatnet vart leia til kraftverket i ei renne av tre som låg på ein steinmur nedover innmarka på vestsida av elva frå inntaket og ned til kraftstasjonen som låg nede ved sjøen (Bjørn Olav Torvik pers. meld.).

Kulturminne innan utbyggingsområdet. Støypejarnsrøyret som vart brukt til drift av sagbruket i Ervika, ligg framleis nedover innmarka på vestsida av elva. Det same gjer muren der trerenna som leidde driftsvatn til kraftverket låg.

5.3

Artsmangfald og vegetasjonstypar

Terrestriske miljø

Vegetasjonstypar og karplanteflora.

Inntak i Ervikelva: Inntaket er som nemnd tenkt plassert ca på kote 125 oppe på brekken ovanfor fossen ver Avkjel-hammaren. Vegetasjonen her består mest av små- og storbregneskog. Tresjiktet er dominert av granplantingar med til dels stort innslag av boreale lauvtreartar som gråor, selje, bjørk og rogn. I feltsjiktet dominerer artar som blåbær, blokkebær, røsslyng, fugletelg og hengeving.

Langs Ervikelva: Rett nedanfor det planlagde inntaket, renn elva utfør fossen ved Avkjel-hammaren. Her skiftar vegetasjonen karakter. På vestsida av elva er det ein bratt bergvegg, godt pågrodd med mose saman med karplanteartar som rosenrot og bergfrue. Nedanfor denne, eit område med rasmark og ulike boreale lauvskogsartar som blant anna selje. Her går også vegen opp frå Ervika. I dette området veks mellom anna blåbærlyng, skogburkne og rosenrot. Lenger nede langs elva er ein del av skogen hogd ut og arealet tilplanta med gran. Her er det meste av vegetasjonen i feltsjiktet skygga ut. Blåbærskogen dominerer elles.

På austsida av elva går vegetasjonen nede ved elva over i storbregneskog, storbregne-bjørk-utfoming (C1b) nedanfor fossen. Det er bjørk som dominerer tresjiktet, i tillegg til andre boreale lauvtreartar som selje, gråor og rogn, og ein del sjølvsådd gran frå granplantingane rundt ikring. I feltsjiktet dominerer artar som skogburkne, mjødurt, junkerbregne, bringebær og sølvbunke. Lenger nede langs elva går vegetasjonen gradvis over til gråor-heggeskog av sølvbunkeutfoming (C3d) (Fremstad, 1997). Gråor og selje finst mest langs elva, medan bjørk og rogn dominerer i lisidene. Lenger oppe i lisidene går også skogen over til blåbærskog. I heile området er det ein del større og mindre blokk og stein og enkelte stader ligg dette tett opp til rasmark. Lenger nede langs bekkeklofta er som nemnd ein del av bjørkeskogen hoggen ned, og det er planta gran. Blåbærskog og småbregneskog med innslag av høgstaudar er det vanlegaste her. Tresjiktet er dominert av bjørk, med stort innslag av selje, gråor og rogn i tillegg til litt gran. I feltsjiktet dominerer artar som blåbær, blokkebær, skogburkne, mjødurt og storfrytle.

Om lag midtvegs nede i utbyggingsområdet kjem ein inn på innmarka i Ervika. Her er det ei blanding av meir eller mindre intensivt drivne jordbruksområde. Nokre av områda øvst er i ein gjengroingsfase. I tillegg er det område rundt innmarka som tidlegare har vore oppdyrka, men som no er grodd att. Her er det mellom anna mykje bjørk. Innmarka er no til dels slått til hesjing samt beita av sau om hausten. Også skogen rundt innmarka ber preg av å vere beita.

Eit ganske breitt belte med kantvegetasjon står att ved elva. Dette er for det meste blåbærskog med bjørk, rogn og gråor, samt ein del gran.

Andre stadar er selje det dominerande treslaget langs elva. I feltsjiktet er det innslag av enkelte høgstaudar som reverbølle og mjødurt i tillegg til bregner som sauetelg og skogburkne. Mykje av kulturmarka er ganske sterkt gjødsla og er såleis uinteressant for biologisk mangfald. I dei øvre delane både på vestsida og austsida av elva, er det betydeleg mindre gjødsla. På vestsida av elva går kulturmarka heilt ned til sjøen. Etter Fremstad (1997) kan denne defineraast som fuktig fattigeng (G1) og frisk fattigeng (G4), vanleg utforming (G4a). Av typiske artar kan nemnast sølvbunke, kystmaure, lyssiv, jordnøtt, blåklokke og smalkjempe.

På austsida av elva finn ein to område med lite gjødsla slåttemark D04 (etter DN handbok 13). Desse er slått og hesja i lang tid, samt haustbeita av sau. Dei seinare åra har beitetrykket gått noko ned, og det har vorte meir mose enn tidlegare (Bjørn Olav Torvik pers. meld.). På desse slåttemarkane er det betydeleg innslag av artar som; kystmaure, gulaks, jordnøtt, blåklokke, småengkall, kveinarter og sølvbunke. Også ein del vanlege beitemarksopp vart registrert her.

Røytraseen for dette prosjektet vil for det meste gå over innmarka vest for elva i Ervika. Denne er skildra ovanfor. I områda ovanfor innmarka er det planta ein del gran.



Figur 11. Biletet viser området der kraftstasjonen er tenkt plassert. Den skal plasserast vest for husa nede ved sjøen i Ervika. Her ser ein også tydeleg fossen nedst i Ervikselva som gjer at anadrom fisk ikkje kjem seg opp i elva. Det var høg vassføring i elva ved dei naturfaglege undersøkingane den 06.10.2012. På austsida av elva skimtar ein slåttemarka som vart avgrensa som naturtypelokalitet ved dei same undersøkingane (Foto; Solfrid Helene Lien Langmo 06.10.2012. ©).

Stasjonsområde og avlaupskanal er planlagt plassert heilt nede ved sjøen på vestsida av elva (Sjå fig. over). Dette er eit forstyrra område som vanskeleg let seg klassifisera etter Fremstad, 1997. Her er det også gjødsla ein del, samt at det går ein veg her. Desse områda er såleis relativt uinteressante i høve biologisk mangfald. Selje er det dominerande treslaget med litt innslag av bjørk. I feltsjiktet dominerer artar som sølvbunke, mjødurt og bringebær. Området er tydeleg prega av husdyrbeite.

Lav- og mosefloraen er lite krevjande innan det meste av influensområdet. Ein finn nokre av dei mest vanlege fuktkrevjande mosane i og ved miljøet i nærliken av elva og bekken. Ein finn også ureiningskjenslevare artar som mellom anna klobekkemose i elva. Frodig, middels artsrik kryptogamflora langs elva vitnar om stabile fukttilhøve. Mosefloraen varierer innan utbyggingsområdet, men er enkelte stadar totalt dominert av nokre få artar. I områda med rasmakr dominerer heigråmose. I kulturmarka dominerer engkransmose og enkelte stader storbjørnemose. Følgjande moseartar vart registrert og namnsett frå nærområdet til Ervikvelva. Fuktkrevjande artar er merka med *. Næringskrevjande artar er merka med **. Dei fleste funna er frå nærområdet til elva/bekken, men nokre vart registrert i eller nær røyrgata;

Almeteppemose	<i>Porella platyphylla</i> **
Bakkefrynse	<i>Ptilidium ciliare</i>
Barkfrynse	<i>Ptilidium pulcherrimum</i>
Bekkerundmose	<i>Rhizomnium punctatum</i> *
Bekketvibladmose	<i>Scapania undulata</i> *
Bekkevrangmose	<i>Plagiochila porelloides</i> *
Berghinnemose	<i>Plagiochila porelloides</i> *
Bergkrokodillemose	<i>Conocephalum salebrosum</i> *
Bergurnemose	<i>Rhabdoweisia fugax</i>
Buttgråmose	<i>Racomitrium aciculare</i>
Engkransmose	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i>
Etasjemose	<i>Hylocomium splendens</i>
Fettmose	<i>Aneura pinguis</i> *
Fjørmosse	<i>Ptilium costa-castrensis</i>
Flakjamnemose	<i>Plagiothecium denticulatum</i> *
Fleinljåmose	<i>Dicranodontium denudatum</i> *
Flikvårmose	<i>Pellia epiphylla</i> *
Glansperlemose	<i>Lejeunea cavifolia</i> *
Hårjamnemose	<i>Plagiothecium piliferum</i>
Kalkmose	<i>Cratoneuron filicinum</i> **
Klobekkmose	<i>Hygrohypnum ochraceum</i> *
Krusfagermose	<i>Plagiognium undulatum</i> *
Kystband	<i>Metzgeria conjugata</i>
Kystlommemose	<i>Fissidens dubius</i>
Kysttornemose	<i>Mnium hornum</i> *
Larvemose	<i>Nowellia curvifolia</i>
Mattehutremose	<i>Marsupella emarginata</i>
Musehalemose	<i>Isothecium myosuroides</i> *
Opalnikke	<i>Pohlia cruda</i>
Prakthinnemose	<i>Plagiochila asplenoides</i> *

Ryemose	<i>Antitrichia curtipendula</i> *
Rødmesigmose	<i>Blindia acuta</i> *
Sagtvibladmose	<i>Scapania umbrosa</i> *
Skogfagermose	<i>Plagiomnium affine</i> *
Skruevrangmose	<i>Bryum capillare</i> *
Småstytte	<i>Bazzania tricrenata</i> *
Sprikemoldmose	<i>Eurhynchium praelongum</i> *
Storbjørnemose	<i>Polytrichum commune</i>
Storhoggtann	<i>Tritomaria quinquedentata</i>
Storkulemose	<i>Bartramia halleriana</i>
Stripefoldmose	<i>Diplophyllum albicans</i> *
Stubbeblonde	<i>Chiloscyphus profundus</i>
Teppekildemose	<i>Philonotis fontana</i> *
Totannblonde	<i>Chiloscyphus coadunatus</i>
Vengemose	<i>Douinia ovata</i> *

Dei fleste eller alle desse artane er typiske for fuktige og sure miljø og alle må seiast å vera vanlege. (Mosane er namnsett av Karl Johan Grimstad og Oddvar Olsen).

Som nemnd tidlegare så er heile utbyggingsområdet relativt artsfattig kva gjeld lav. Dei vanlegaste artane i lungeneversamfunnet slik som lungenever og skrubbenever vart registrert på fleire stader langs elva. Også artar som rundporelav, papirnever, kystårenever, grynvrente, glattvrente og brei fingernever vart registrert. Fleire seljer hadde til dels mykje rundporelav. Det meste av influensområdet er dominert av artar frå kvistlavsamfunnet slik som; bristlav, brunt korallav, vanleg kvistlav, dronninglav, rosett mellav, skjoldsaltlav, stiftbrunlav, vanleg papirlav, samt diverse stylav og skjegglav på bjørk, og i tillegg er ymse busklav og skorpelav som er karakteristiske for stein og berg ved elver og bekkar til stades.

Konklusjon for mosar og lav. Med unntak av bergveggane ved fossen ved Avkjel-hammaren er heile elvestrengen greitt tilgjengeleg for å undersøkast. Ein middels artsrik moseflora, men kombinert med harde og sure bergartar indikerer ikkje direkte at mosefloraen i dette området skal vera særskild interessant. Vi tek likevel eit lite etterhald her, då desse områda kan huse sjeldne artar som særskild krev stabilt fuktige tilhøve. Også røygatetraseen er greitt tilgjengeleg for undersøking. Ut frå potensialet er det likevel liten grunn til å tru at det skal finnast særleg mykje anna enn det som er nemnd i rapporten. Heile utbyggingsområdet er i hovudsak eksponert mot nordvest, medan det optimale for dei mest fuktrevjande kryptogamartane hadde vore at elva hadde vendt mot nordaust. Når dei mest fuktrevjande artane ser til å mangla her, så ligg mykje av forklaringa i eksponeringa mot nordvest, samt i ein fattig berggrunn. Artar somgneis og granitt gjev sjeldan rom for nokon rik flora. Rike førekommstar av mosar på trestammar og steinar i og ved elva, vitnar likevel om eit jamt over fuktig mikroklima.

Funga. Ingen interessante artar frå denne artsgruppa vart registrert og identifisert. Daud ved av litt grove dimensjonar manglar for det meste, og

utanom sokkjuke og knivkjuke så vart vedboande sopp knapt nok registrert her. Av andre arter kan nemnast kantarell og raudskrubb. Ein registrerte nokre vanlege beitemarksopp på innmarka slik som; skjør vokssopp, honningvokssopp, kjeglevokssopp, seig vokssopp og kritvokssopp. Dei fleste artsgrupper av sopp verkar å ha heller dårleg potensiale for raudlisteartar, men eit unntak kan vera innmarka der det ganske nyleg var beita med sau, og nokre artar kan difor vere beita ned. Årsak til dårleg potensiale for raudlista sopp: Fattig berggrunn gjev sjeldan grunnlag for ein artsrikdom av sopp. Mangel på kontinuitetselement i form av gammal skog og læger i ulike aldersfasar er også negativt med tanke på ein rik vedboande funga.

Ved inventeringa vart potensialet for virvellause dyr (invertebrata) vurdert, både i og utanfor sjølve elvestrengen. Potensialet for funn av sjeldne og raudlista artar av til dømes biller er vurdert som dårleg. Årsaka er mangel på høvelege habitat og substrat.

Av fugl vart mest berre vidt utbreidde og trivielle artar påvist under inventeringa, slik som nokre meiser og trostar. Ein observerte også fossekall under dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012. Fylkesmannen hadde ikkje noko å melde om skjerma artar i nærliken av influensområdet, men fleire hekkelokalitetar for havørn er registrert nokre kilometer unna (Tore Larsen pers meld.). Rådgjevar i avdeling for byggesak og arealforvaltning i Førde kommune, Oddbjørn Sellevoll hadde ingen opplysningar om raudlista rovfuglar eller andre raudlista fuglar i dette området. I fylgje Artskart er dei fleste spetteartane med unntak av svartspett observert innanfor Førde kommune. Også dei vanlege ugleartane, haukar og våkar i tillegg til storfugl, orrfugl og rype finst i området. Det same gjeld strandsnipe (**NT**) (<http://artsdatabanken.no>).

Pattedyr og krypdyr. Berre hjort er ein jaktbar storviltart i Førde, slik som dei fleste stadane i Sogn og Fjordane fylke. Elles er rev, mår, snømus og røyskatt vanlege rovdyrartar. Også mink og oter (**VU**) finst i området, og i følgje grunneigar Torvik, så er oter vanleg innanfor heile influensområdet til kraftverket. Hare og ekorn finst også her. Av krypdyr kjenner ein ikkje til andre enn hoggorm og av amfibium, padde.

Akvatiske miljø

Ervikelva renn slakt nedover innanfor det meste av utbyggingsområdet med unntak av fossen ved Avkjel-hammaren og nokre mindre fossar elles. Botnsubstratet i elva består for det meste av blokk og rullestein av ulik storleik. Gytesubstrat for bekkeaur er til stades i hølar og bak større steinar. Som tidlegare nemnt, er det eit om lag 50 meter langt svaberg heilt nedst i Ervikelva som utgjer absolutt vandringshinder for anadrom fisk. Det er ein del pågroing av mosar og algar i elva. Noko av dette kjem truleg av landbruksverksemder lenger opp i vassdraget. Likevel finst ein ureiningskjenslevar art som klobekkemose her.

Fisk, ål og elvemusling. I fylgje grunneigar Bjørn Olav Torvik finst det ein bestand av bekkeaur på strekninga. Dette er ein ikkjeprioritert art for forvaltninga i følgje DN-handbok 15. Det er ikkje sannsynleg at anadrom fisk klarer å gå opp i Ervikelva, men ein kan ikkje heilt sjå bort frå at det førekjem ål innanfor utbyggingsområdet, sjølv om det verkar lite truleg. Ved gjennomgang av databasen som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har oppretta i samband med handlingsplan for elvemusling, fann ein at det i Førde kommune ikkje er registrert vassdrag med kjend førekomst av elvemusling. I fylgje Kålås m. fl. 2010, er det berre påvist elvemusling i fire vassdrag i Sogn og Fjordane (Kålås m. fl. 2010). For fleire opplysningar, sjå kapittel 5.1. om kunnskapsstatus.

Ved dei naturfaglege undersøkingane vart potensialet for virvellause dyr (invertebratar) vurdert, også i sjølve elvestrengen. Potensialet for funn av raudlisteartar frå desse gruppene er vurdert som därleg. Dette vert grunna ut frå mangel på botnvegetasjon. For det meste renn elva relativt hurtig innan utbyggingsområdet, med mykje stor stein og blokk i elva. I slike vassdrag er det sjeldan ein finn interessante artar. Det er helst i rolege elveparti med godt utvikla botnvegetasjon desse finst. Den rimeleg godt utvikla mosefloraen indikerer likevel ein ganske stor biologisk produksjon i elva, og dermed brukbare tilhøve for fossekall. I dei seinare åra har det også vist seg at breelvar kan vere oppvekstområde for ein del interessante arter av fjørmygg. Blant anna har ein funnet nokre nye artar for vitskapen i slike elvar.

5.4

Raudlisteartar

Det vart ikkje påvist raudlisteartar under dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012 og heller ikkje ved tilsvarende naturfaglege undersøking i 2009 (Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010). Oter (**VU**) finst truleg innan heile influensområdet. Denne kan vandre heilt til fjells om det finst fisk i vatna. Strandsnipe (**NT**) er registrert i vassdraget i følgje Artsdatabankens Artkart.

5.5

Naturtypar

Det er hovudnaturtypen skog (F) som dominerer innan mykje av utbyggingsområdet. Dei nedste delane av utbyggingsområdet kjem inn under kulturlandskap (D). Sjølve elva kjem inn under ferskvatn og våtmark (E). Innan nedbørssområdet er det i tillegg store areal med myr (A) og fjell (C). Når det gjeld vegetasjonstypar, så viser vi til kapittel 5.3 om vegetasjonstypar og karplanteflora.

Naturen langs Ervikselva er variert. Ein valde under den naturfaglege undersøkinga 24.10.2009 å avgrense dei øvre delane av bekkekløfta som prioritert naturtype bekkekløft og bergvegg (F09) etter DN handbok 13. Lokalitetsskildringa vart oppdatert etter den naturfaglege undersøkinga 06.10.2012 for at den skulle vera i samsvar med nye retningslinjer fra Direktoratet for Naturforvaltning. Ved dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012 valde ein også å avgrense kulturmarka på austsida av elva som prioritert naturtype slåttemark (D01).

Lok. nr. 1. Ervikselva. Bekkekløft og bergvegg (F09). Verdi: Lokalt viktig -C.

Førde kommune i Sogn og Fjordane
UTM EUREF89 32N N6817739 A320568

Høgde over havet: Ca 55-120 m

Naturtyperegistreringar:

Naturtype: Bekkekløft og bergvegg (F09) (100%).

Utforming: Bekkekløft F0901, bergvegg F0902, storbregneskog, storbregne – bjørk-utforming (C1b), småbregneskog blåbærskog, blåbær-skrubbær-utforming (A4b), rasmark, Stabil utforming på moserik, grovsteinet Blokkmark (B0106)

Verdi: Lokalt viktig - C.

Vernestatus: Ingen vernestatus.

Feltsjekk: 24.10.2009 av Geir Frode Langelo og Karl Johan Grimstad og 06.10.2012 Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo

Lokalitetsskildring:

Innleiing: Lokaliteten vart først kartlagd 24.10.2009 av Geir Frode Langelo og Karl Johan Grimstad og 06.10.2012 av Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo på oppdrag frå Bioreg AS i samband med utredning av planar for småkraftverk i Ervikelva.

Plassering og naturgrunnlag; Lokaliteten ligg om lag 12 km vest for Førde sentrum, og omfattar bekkekløfta nedanfor fossen ved Avkjel-hammaren i Ervikelva i Førde kommune. Den er om lag 400 meter lang, og elva renn i all hovudsak i nordvestleg retning innanfor lokaliteten. Området utgjer ei markert bekkekløft med ganske bratte sider med til dels loddrette bergvegger som er brattast øvst i lokaliteten, men flatar ut lengre ned. I følgje berggrunnskartet er det diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, som dominerer berggrunnen her. Moen (1998) plasserer lokaliteten i sterkt oseanisk seksjon (O3h). Same kjelde plasserer lokaliteten i sørboreal vegetasjonssone.

Naturtypar, utformingar og vegetasjonstypar; Lokaliteten er avgrensa som bekkekløft og bergvegg (F09) (100 %). Vegetasjonen langs kløfta er mest blåbærskog av blåbær-skrubbær-utforming (A4b), men oppover i kløfta finn ein område med gråor-heggeskog av sølvbunkeutforming (C3d) og storbregneskog, storbregne-bjørk-utforming (C1b) (Koding etter Fremstad (1997). Heilt inne under fossane innanfor lokaliteten, er det til dels loddrette bergvegar (F0902) tilgrodd med mose.

Artsmangfold; Ung til middels gammal bar- og lauvskog dominert av bjørk og gran med innslag av boreale lauvtre nedst i lokaliteten. Oppover i lokaliteten dominerer bjørk med innslag av andre boreale lauvtreslag som selje, gråor og rogn samt ein del yngre, sjølvstånd gran. Her er ein del læger av bjørk i ulike nedbrytingsfasar. Berggrunnen er fattig, og området er dominert av mindre kravfulle artar som blåbær og blokkebær. Oppover i lokaliteten er jordsmonnet noko rikare, og artar som mjødurt, bringebær, markjordbær, skogstjerneblom, vendelrot, revebjølle, trollurt, sauetelg, skogburkne, junkerbregn og storfrytle er registrert, - med andre ord typisk høgstaudeskog. I tillegg veks artar som bergfrue og rosenrot i bergsprekker. Av mosar kan nemnast musehalemose, etasjemose, buttgråmose, kalkmose, mattehutmose, opalnikke og storkulemose. Av lav kan nemnast skrubbenever, lungenever, åregrønnever, rundporelav, grynvrente og papirnever.


Bruk, tilstand og påverknad: Det er planta noko gran, spesielt mellom vegen og elva nedst i lokaliteten. I tillegg har grana spreidd seg slik at det står ein del spreidde unge grantre i området. Det er også bygd ein stikkveg frå hovudvegen og ned i kløfta i det øvste området. Området er truleg sporadisk beita av sau, og har nok tidlegare også vore beita av storfe og geit. Ein kjenner ikkje til at elva har vore nytta til industriell verksemd innanfor lokaliteten.

Framande artar; Ingen framande artar vart registrert innan lokaliteten.

Skjøtsel og omsyn; Det vil vera best for naturverdiane innan den avgrensa bekkekløfta at lokaliteten får være mest mulig i fred for alle former for menneskelege inngrep. Grana kan med fordel takast ut.

Verdivurdering: Bekkekløfta er påverka av menneskelege aktivitetar både i form av hogst og husdyrbeitig, og floraen er generelt fattig. På vestsida er det ein del læger av lauvtre i fleire nedbrytingsfasar. Kløfta er nordvestvendt og delar av ho har truleg eit stabilt fuktig mikroklima heile året. Dette gjer at det er eit visst potensiale for sjeldne mosar som er avhengig av kontinuerlig høg luftfukt. Under tvil så vart kløfta avgrensa og verdisett til; *lokalt viktig – C*.

For biletet frå lokaliteten, sjå figur 15.



Figur 12. Kartet viser avgrensning av bekkekløfta ved Ervikelva. Kartet er henta frå GisLink.

Lok. nr. 2. Ervikelva aust. Slåttemark (D01).

Verdi: Viktig -B.

Førde kommune i Sogn og Fjordane
UTM EUREF89 32N N6817898 A320327

Høgde over havet: Ca 25-50 m

Naturtyperegistreringar:

Naturtype: Slåttemark (D01) (80%), blåbærblandingsskog (20%).

Utforming: Frisk fattigeng (D0104) (80%) og blåbærblandingsskog (20%).

Verdi: Viktig - B.

Vernestatus: Ingen vernestatus.

Feltsjekk: 06.10.2012 Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo.

Lokalitetsskildring:

Innleiing: Lokaliteten er kartlagd 06.10.2012 av Karl Johan Grimstad, Oddvar Olsen og Solfrid Helene Lien Langmo på oppdrag frå Bioreg AS i samband med utgreiing av planar for småkraftverk i Ervikelva.

Plassering og naturgrunnlag; Lokaliteten ligg om lag 12 km vest for Førde sentrum, og omfattar gammal kultureng aust for Ervikelva i Ervika i Førde kommune. Den er om lag 140 meter lang. Området består av to mindre lokalitetar på til saman om lag 5 daa, skild av eit område med blåbærblandingsskog der det også er planta noko gran. Heile området skrånar slakt nedover mot fjorden. I følgje berggrunnskartet er det diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, som dominerer berggrunnen her. Moen (1998) plasserer lokaliteten i sterkt oseanisk seksjon (O3h). Same kjelde plasserer lokaliteten i sørboreal vegetasjonssone.

Naturtypar, utformingar og vegetasjonstypar; Lokaliteten er etter DN handbok 13 avgrensa som slåttemark (D01) (80 %). Vegetasjonen er i all hovudsak frisk fattigeng (D0104). Etter Fremstad (1997) er vegetasjonen i området mest frisk fattigeng, jordnøtt-utforming (G4b) I tillegg er det eit område med blåbærblandingsskog mellom naturbeitemarkene.

Artsmangfold; Slåttemark i god hevd, og utan teikn til gjengroing. Kortvakse og ljoseope feltsjikt dominert av artar som kystmaure, gulaks, knegras, kvein-arter, jordnøtt, smallkjempa og blåklokke. Områda rundt, og mellom dei to dellokalitetane er dominert av artar som blåbær, blokkebær, einer, furu, bjørk og gran. Ein del beitemarksopp vart registrert, mellom anna krittvokssopp, kjeglevokssopp, honningvokssopp, skjør vokssopp og seig vokssopp. Eit besøk før slått og beiting ville truleg ha utvida artslista av karplantar betydeleg.

Bruk, tilstand og påverknad: Det er eit område med skog mellom dei to dellokalitetane. Her er det planta noko gran, i tillegg til at det veks lauvskog der. Begge dellokalitetane er slått og hesja. Dei er også beita av sau om hausten. Tidlegare har området truleg også vore beita av storfe og geit. Eit skjul for hjortejakt er sett opp i skogen mellom dei to områda. Det går ein jordbruksveg mellom områda.


Framande artar: Ingen framande artar vart registrert innan lokaliteten.

Skjøtsel og omsyn: Det vil vera best for naturverdiane innan den avgrensa lokaliteten at slått og beite vert oppretthalde. Beitetrykket kan med fordel aukast noko. Grana i området mellom dei to areala kan med fordel takast ut.

Verdivurdering: Område brukt til beite og slått i god hevd er ein naturtype i sterke tilbakegang. Slåttemark av typen jordnøtt-utforming (G4b) er truga. God hevd og indikatorartar på dette, i tillegg til få registrerte lokalitetar av same type innanfor kommunen, gjev lokaliteten verdien; *viktig – B*.



Figur 13 Førebels avgrensing av lokaliteten. Kartet er henta frå GisLink.



Figur 14. Biletet er frå den øvste av dei to dellokalitetane. (Foto; Solfrid H. Lien Langmo 06.10.2012. ©).



Figur 15 Dette satellittbiletet viser den avgrensa lokaliteten. Det var svært vanskeleg å få eit godt oversiktsbilete over heile lokaliteten, då den er delt i to område med skog imellom, og den skråna bratt ned mot sjøen. Som ein ser er desse områda mykje mindre gjødsla enn områda på vestsida av elva. Områda er først og fremst nytta til slått, og haustbeite for sau. Satellittbiletet er henta fra GisLink.

6

VERDI, OMFANG OG VERKNAD AV TILTAKET

Her følgjer ein delvis metoden for konsekvensvurderingar, men utan bruk av 0-alternativ og omgrepa er noko endra. I tillegg vert undersøkingsområdet prøvd samanlikna med resten av nedbørsfeltet og/eller andre vassdrag i distriktet.

6.1

Verdien av utbyggingsområdet

Det er eit visst potensiale for funn av sjeldne og raudlista artar av kryptogamar knytt til stabilt fuktige miljø innan influensområdet for dette prosjektet. Oter (**VU**) streifar truleg oppover i vassdraget. Strandsnipe (**NT**) er registrert i vassdraget i følge Artsdatabanken sitt Artskart. Eit velutvikla bekkekloftmiljø og ein del kontinuitet i død ved inne i bekkeklofta, verdfull slåttemark innanfor influensområdet, samt ein betydeleg produksjon av biomasse i elva, gjer at den samla verdien for biologisk mangfald av utbyggingsområdet inkludert influensområdet til dette tiltaket vert vurdert som **middels** om ein også reknar verdien av sjølve elvestrengen. Vurderinga er gjort ut frå eit totalbilete, samt ei samanlikning med kva som er vanleg å finna av naturverdiar ved slike mindre elver og bekkar.

Verdi		
Liten	Middels	Stor
----- -----		

6.2

Omfang og verknad

Tiltaket medfører at elva/bekken mellom inntaka og den planlagde kraftstasjonen i periodar får lita vassføring. Tiltaksplanane går ut på å grava/sprenga ned det meste av røyret og det vil slik ikkje verta til hinder for ferdsel verken for menneske eller dyr. Rørtrasèen vil for det meste gå gjennom innmark utan særleg av verdiar for biologisk mangfald. Reduksjon i vassføringa i Ervikvelva vil spela ein stor rolle for det lokale mikroklimaet ved elva, då mykje av verdiane i kløfta er knytt til eit stabilt fuktig miljø. Særleg med tanke på den biologiske produksjonen i elva, men også for å syta for at det framleis vil vera eit relativt fuktig miljø langs elvestrengen vil det vera best med ei relativt høg minste vassføring. (Sjå seinare!). Den nordvestvende eksposisjonen saman med eit generelt skuggefullt miljø gjer likevel at det fuktige miljøet truleg langt på veg vert oppretthalde sjølv om vassføringa skulle verta vesentleg mindre. Slåttemarkane registrert aust for elva ligg innanfor influensområdet til det planlagde tiltaket, men verdiane her er på ingen måte knytt til det fuktige miljøet i elva. Desse kjem mest av lang hevd i form av beite og slått. Slåttemarkane vert heller ikkje rørt ved av røygata.

Utanom dei punkta som er nemnd ovanføre, så skulle det ikkje vera særleg store konfliktar knytt til dette prosjektet med tanke på biologisk mangfald. Etter vårt syn er det berre dei negative verknadane det kan få for produksjon av botnfauna som er nemnande elles.

Redusert vassføring i elver vil kunne påverka ei rekke artsgrupper. Raddum m.fl. har kort greidd ut om følgjande generelle verknader ved ei vasskraftutbygging, men vi gjer merksam på at dette er generelle skadeverknadar som kan oppstå. Vi trur ikkje mange av desse punkta har særleg relevans ved ei utbygging av Ervikvelva, men tek ho med likevel;

Nedst i næringskjeda er botndyra og larvane deira, og effekten på desse av redusert vassføring er då summert opp slik (Raddum mfl. 2006):

1. Redusert vassføring gjev redusert areal for produksjon av botndyr. Reduksjonen i botnareal er oftast proporsjonal med vassføringa, noko avhengig av profilen i botnstrengen på elva.
2. Redusert vassføring gjev vanlegvis auka temperatur, auka sedimentering og uendra eller auka tettleik av botndyr i dei vassdekte botnareaala. Samansetjinga av artar kan verta endra.
3. Auka vassføring aukar vassdekt areal som botndyr kan nydda. Auka vassføring gjev som regel redusert temperatur. Botnfaunaen kan også verta endra på grunn av endring i botnsubstrat, auka vekst og auka driv som vaskar ut larvar og daudt organisk materiale.
4. Sterkt fluktuerande vasstand gjev store skadar ved at dei negative effektane av tørrlegging og høg vassføring stadig vert gjenteke.
5. Tørrlegging over lengre periodar medfører utradering av ein stor del av botndyra.

Desse endringane kan så i sin tur gje endra livsvilkår for vassdragstilknytte artar av fugl og pattedyr gjennom m.a. endringar i næringstilgang og reproduksjon/hekkeseksess. I vassdragssaker har det vore fokusert mest på fossekall, sidan den er den sporvefuglen som har sterkest tilknyting til rennande vatn, men artar som strandsnipe (**NT**),

vintererle og sivsporv kan også verta negativt påverka av vassdragsendringar. Eventuelle fiskepopulasjonar vert sjølvsagt også negativt påverka av desse endringane.

No er ikkje Ervikselva i utbyggingsområdet særskild godt egna for fisk, og den fører ikkje anadrom fisk. Det hekkar truleg både fossekall og strandsnipe innanfor influensområdet, men såpass kort elvestrekning som dette gjeld har vi ikkje vektlagd dette i særleg grad kva gjeld omfang. Om dei avbøtande tiltaka som det vert kome med framlegg om (sjå seinare i rapporten) vert følgd opp, så reknar vi at samla omfang av utbygginga vert **middels/lite negativt**.

Omfang: *Middels/lite negativt.*

Omfang av tiltaket				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / ikkje noko	Middels pos.	Stort pos.
----- ----- ----- ----- -----				

Om ein held saman verdi og omfang, så vil verknaden verta; **Middels negativ.**

Verknad/konsekvens: *Middels negativ*

Verknad av tiltaket						
Sv.st.neg.	St.neg.	Midd.neg.	Lite / ikkje noko	Midd.pos.	St.pos.	Sv.St.pos.
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

6.3

Samanlikning med andre nedbørdfelt/vassdrag

I følgje handboka så er verknader og konfliktgrad avhengig av om det finst liknande kvalitetar utanfor utbyggingsområdet. Det finst fleire varig verna vassdrag både i Førde og i nabokommunane (Sjå kartet under!). Det er også kjent at det ligg føre planar om utbygging av fleire større og mindre vassdrag både i Førde og i nabokommunane. Samtidig veit ein at mange av vassdraga i dette området allereie er utbygd. Det er ein godt utvikla og middels rik kryptogamflora langs elva og ved fossen ved Avkjel-hammaren, og dette vitnar om eit stabilt fuktig mikroklima. Sjølv om ingen raudlista artar vart funne ved dei to undersøkingane som er gjort, er det likevel eit visst potensiale for at slike artar finst langs elva og vi tenkjer da mest på artar knytt til habitat med høg luftråme. Ut over dette er det ikkje påvist særskild store verdiar og kvalitetar som spesifikt kan knytast til elva innan influensområdet, anna enn det ein kan venta seg, slik som den eventuelle verdien som elvestrekninga har for fossekall og anna vasstilknytt fugl som strandsnipe (**NT**) og for oter (**VU**). Det er da grunn til å tru at desse andre verdiane kan verta tekne vare på av andre ikkje utbygde vassdrag i Førde og andre kommunar i Sunnfjord, samt av Ervikselva oppstraums inntaket.



Figur 16. Kartet viser at det er ein del større varig verna vassdrag i nabokommunane til Førde. Kartet er henta fra GisLink.



Figur 17. Rundporelav vart påvist fleire stadar på selje langs elva. (Foto; Oddvar Olsen 06.10.2012 ©).

7

SAMANSTILLING

Generell skildring av situasjon og eigenskapar/kvalitetar	i) Vurdering av verdi
Ervikelva innan utbyggingsområdet er eit raskt strøymanande vassdrag. I det aktuelle utbyggingsområdet for dette tiltaket har elva tilførsel frå eit nedbørsfelt på om lag 21,6 km ² med ei årleg middelavrenning på 1860 l/s. Vegetasjonen i området er jamt over fattig, med eit litt rikare miljø opp i bekkekløfta. Den består i alle hovudsak av blåbærskog, med innslag av småbregneskog og noko storbregneskog nede i bekkekløfta. Det hekkar fossekall og strandsnipe innanfor influensområdet.	Liten Middels Stor ----- ----- ▲
Datagrunnlag: Hovudsakleg eigne undersøkingar 24.10.2010 og 06.10.2012, samt naturbasen og artskart. Bjørn Olav Torvik har vore representant for grunneigarane og har kome med opplysningar av ymse karakter, medan Odd Rune Håland har vore ansvarleg for dei tekniske opplysningane. Også bygdebok for området har vore nyttar for å framskaffa opplysningar. Elles har ein motteke opplysningar både frå administrasjonen i Førde kommune og frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.	Godt
ii) Skildring og vurdering av moglege verknader og konfliktpotensiale	iii) Samla vurdering
Prosjektet er planlagd med inntak i Ervikelva om lag på kote 125. Vatnet vert leie gjennom profilbora tunell ned til om lag kote 75 og derfrå vidare i nedgravne røyr til kraftstasjonen som er planlagt nede ved sjøen i Ervika. Samla lengde på røyret er ca 720 meter med Ø = 1400 mm. Tilknytinga til eksisterande nett vil bli gjort gjennom jordkabel til opp til eksisterande 22 kv-line som kjem ned i Ervika og held fram vestover langs Førdefjorden.	Deler av influensområdet for dette tiltaket er undersøkt tidlegare, den 24.10.2009, i samband med tidlegare planar om kraftverk i Ervikelva (Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010). Planane stogga opp den gongen, men det var ved desse undersøkingane at delar av tiltaksområdet vart avgrensa som bekkekløft og bergvegg. Ved dei naturfaglege undersøkingane 06.10.2012 vart kulturmarka på austsida av elva avgrensa som slåttemark. Vassføringa i elva mellom inntak og kraftstasjon vil verta sterkt redusert. Dette kan medføra noko redusert produksjon av ymse invertebratar, noko som i sin tur fører til litt dårlegare tilhøve for vasstilknytte fuglar som fossekall og strandsnipe (NT), og for fisk. I tillegg vil tilhøva for fuktkrevjande kryptogamar vera noko dårlegare langs elva. Omfang: Stort neg. Middels neg. Lite/ikkje noko Middels pos. Stort pos. ----- ----- ----- ----- ▲

8

MULEGE AVBØTANDE TILTAK OG DEIRA EFFEKT

Då det ofte er vasslevande insekt og dermed fossekall og fisk som vert skadelidande av slike utbyggingar, så vil ein vanlegvis tilrå minstevassføring ut frå slike grunngjevingar. Slik er det også i dette tilfellet.

Kva gjeld vasstilknytt fugl, er det registrert både fossekall og strandsnipe (**NT**) i vassdraget. Ein observerte også fossekall under dei naturfaglege

undersøkingane 06.10.2012. Det vart registrert kryptogamar i ei bekkekløft som tilseier at det er viktig med eit stabilt fuktig miljø, sjølv om ingen av dei registrerte artane er raudlista. Ein ser likevel ikkje bort frå at slike artar finst i bekkekløfta og vi vil difor koma med framlegg om at 10-persentilen vert lagt til grunn for den pålagde minstevassføringa om sommaren, medan 5-persentil vinter vil vera tilstrekkeleg i vinterhalvåret. For kryptogamane er det i første rekke i vekstsesongen det er viktig med minstevassføring, men om ein skal ta omsyn til botnfaunaen, så er det også viktig at elva ikkje går tørr om vinteren. Eit slik tiltak vil i nokon grad redusera dei eventuelle negative verknadane av ei utbygging.

For å betra hekkevilkåra for fossekall etter ei eventuell utbygging bør predatorsikre hekkekassar for fuglen monterast på minst ein stad ved elva. I dette tilfellet vil den beste staden truleg vera ved fossen ved Avkjel-hammaren. Også under bruer kan vera gode stadar for slike kassar. Viktigast er det likevel å montera kassar der det eventuelt er påvist reir. Ein bør montera to kassar på kvar stad.

Forstyrra miljø (vegar, grøfter og liknande) bør ikkje såast til med framandt plantemateriale.

9

VURDERING AV USIKKERHEIT

Registrerings- og verdiusikkerheit. Det meste av influensområdet er oppsøkt og vurdert, særleg med tanke på karplantar, mose og lav. Det er likevel eit område ved Avkjel-hammaren som ikkje var muleg å koma til, utan å utsetja seg for ein vesentleg risiko. Det er difor knytt noko usikkerheit til om kor vidt det kan finnast sjeldne og/eller spesielt fuktkrevjande mosar her. Ein kan heller ikkje sikkert konstatere kor vidt å finst innanfor influensområdet til dette prosjektet. Vi vurderer difor registrerings- og verdisikkerheita som middels. Utanom desse to punkta, så vurderer vi både geografisk og artsmessig dekningsgrad som god innan influensområdet til prosjektet.

Usikkerheit i omfang. Ut i frå dei registreringane og verdivurderingane som er gjort, og slik planane er skissert, så meiner vi at usikkerheita på dei fleste punkta er lita. Unntaket er omfanget for dei delane av bekkekløfta ein ikkje fekk undersøkt, samt for å om arten likevel skulle finnast her.

Usikkerheit i vurdering av konsekvens. Sidan vi ser på usikkerheita i registrering og verdivurdering som middels, og uvissa i omfangsvurderingane som relativt lita, så vil usikkerheita i konsekvensvurderinga verta middels/lita for heile dette prosjektet.

10

PROGRAM FOR VIDARE UNDERSØKINGAR OG OVERVAKING

Ein kan ikkje sjå at det skulle vere naudsynt med vidare undersøkingar og overvakning av naturen som vert påverka av dette prosjektet. Det einaste kunne vera ein el-fiskeundersøking for å avgjera om det finst ål i elva eller ikkje.



Figur 18. Biletet viser området for tunellinnslag ovanfor vegen i Ervika. Innslaget er tenkt litt til høgre for midten av biletet. Som ein ser er det planta ein del gran her. Elles kan kulturenga her definerast som fuktig fattigeng. (Foto: Odd Rune Håland ©).



Figur 19 Fossen ved Avkjel-hammaren i Ervikselva. Her ser ein dei bratte bergveggane rundt fossen godt. Ein ser også pågroinga av mose i og ved elva, samt den relativt høge vasstanden ved den naturfaglege undersøkinga. Denne fossen er kjerna i den avgrensa bekkekløfta. (Foto; Karl Johan Grimstad 06.10.2012 ©).

REFERANSAR

10.1 Litteratur

- Blom, H. 2006. Viktige moseartar knytt til, eller vanlege i vassdrag, - artsutval Vestlandet. (Liste over mosar og økologi/næringskrav/substrat laga i samband med mosekurs halde av Hans Blom i Bergen i juli 2006)
- Brodkorb, E., & Selboe, O-K. 2004, "Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1 -- 10 MW). Revidert utgave" : Vegleiar nr. 3/2009. Utgitt av NVE.
- Cramp, S. (red.). 1988. The Birds of the Western Palearctic. Vol. V. Oxford Univ. Press, Oxford.
- Det kongelige olje- og energidepartement 2003. Småkraftverk - saksbehandling. Brev av 20.02.2003. 1 s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1996. Viltkartlegging. DN-håndbok 11. (revidert i 2000).
- Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. Ny revidert utgave av DN-håndbok 1999-13.
- Direktoratet for naturforvaltning 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15-2000.
- Efteland, S. 1994. Fossekall *Cinclus cinclus*.S. 342 i: Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.): *Norsk fugleatlas*. Norsk Ornitolig Forening, Klæbu.
- Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12. 279 s.
- Førsund, F. B. 1992. Førde bygdabok. Gardssoge og soga om folket, Band II. Førde kommune
- Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk raudliste for artar 2010. Artsdatabanken, Norge.
- Kålås, S. & B. M. Larsen. 2012. Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010. Rådgivende Biologer AS rapport 1493, 36 sider, ISBN 978-82-7658-881-1
- Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Solheimselva Kraftverk AS i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2010 : 16. ISBN 978-82-8215-109-2
- Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, Trondheim.
- OED 2007. Retningslinjer for små vannkraftverk.
- Puschmann, O. 2005. "Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner." NIJOS- rapport 10/2005. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. Side 134-137.
- Raddum, G., Arnekleiv, J. V., Halvorsen, G. A., Saltveit, S. J. og Fjellheim, A. Bunndyr. Økologiske forhold i vassdrag – konsekvenser av vannføringsendringer. Norges Vassdrags- og energidirektorat, Oslo.
- Statens vegvesen 2006. Håndbok 140. Konsekvensanalyser. 292 s.
- Walseng, B & Jerstad, K. 2009. Vannføring og hekking hos fossekall – NINA Rapport 453. 26 s.

10.2**Munnlege kjelder**

Tore Larsen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernnavdelinga.

Bjørn Olav Torvik, grunneigar. Tlf. 952 28 676. Adr. Ervik, 6800 Førde.

Oddbjørn Sellevoll, rådgjevar i avdeling for byggesak og arealforvaltning i Førde kommune.

Odd Rune Håland, Sunnfjord Energi AS

Bjørn Helge Drage, O. Drage AS. Tlf. 970 16 970, Adr. Lysthaugen 23, 6800 Førde

10.3**Kilder fra internett****Dato****Nettstad**

25.01.13	Artsdatabanken, Rødlista og Artskart
25.01.13	Direktoratet for naturforvaltning, INON
25.01.13	Direktoratet for naturforvaltning, Lakseregisteret
25.01.13	Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase
25.01.13	Direktoratet for naturforvaltning, Rovbase
25.01.13	Direktoratet for naturforvaltning, Vannmiljø
28.01.13	GisLink, karttjenester
15.01.13	Hugin.nt/elvemusling
16.01.13	Norges geologiske undersøkelser, Berggrunn og lausmasser
15.01.13	Norsk Meteorologisk Institutt, met.no, eKlima
15.01.13	Rein driftsforvaltninga, Reinkart
25.01.13	Riksantikvaren, Askeladden kulturminner
28.01.13	Universitetet i Oslo, Lavdatabasen
28.01.13	Universitetet i Oslo, Mosedatabasen
14.01.13	Universitetet i Oslo, O Rygh. Norske Gaardnavne
28.01.13	Universitetet i Oslo, Soppdatabasen